



NAHALAHUS
Tricovivax[®]
Minoxidilum

AITAB TAASTADA
 JUUKSEKASVU NING VÄLTIDA
 JUUSTE VÄLJALANGEMIST!

50 mg/ml; nahalahus 60 ml
 1ml lahust sisaldab 50 mg minoksidiili

Ravimi toimeaine:
 Minoksidiil (*Minoxidilum*)

RAVIMVORM: Nahalahus.

NÄIDUSTUSED: Androgeense alopeetsia (juuste väljalangemine) paikne ravi täiskasvanutel.

ANNUSTAMINE JA MANUSTAMISVIIS:

Tricovivaxi kasutatakse ainult välispidiselt tervel peanahal. Jooksed ja peanahk peavad olema täielikult kuivad!

Tricovivaxi ei soovitata alla 18-aastastele ja üle 65-aastastele patsientidele, rasedatele ning imetavatele emadele, kuna puuduvad andmed ohutuse ja efektiivsuse kohta.

ANNUSTAMINE MEHEDE:

2 korda päevas vajutada pihustit 6 korda. Maksimaalne ööpäevane annus on 2 ml ehk 12 pihustuskorda, mis vastab 100 mg minoksiidi kogusele

ANNUSTAMINE NAISED:

1 kord päevas vajutada pihustit 6 korda. Maksimaalne ööpäevane annus on 1 ml ehk 6 pihustuskorda, mis vastab 50 mg minoksiidi kogusele

KASUTAMINE:

Lahus kanda kahjustatud ala keskele ja hõõruda sõrmeotstega laiali.

MANUSTAMISVIIS:


1. Pihusti:

- Eemaldage pudeli välimine kork;
- Manustage 1ml lahust, vajutades pihustit 6 korda. Lokaalsemaks kasutamiseks (peanaha väikesed alad või juuste all) kasutage pakendiga kaasas olevat aplikaatorit (1ml märgiga).



2. Aplikaator:

- Eemaldage pudeli välimine kork;
- Eemaldage pihustuspea ülemine osa (osa koos avaga), tõmmates seda üles ja sisestage aplikaator;
- Manustage 1ml lahust, vajutades aplikaatorit 6 korda.



RAVI KESTUS:

Märgatava juuste kasvu jaoks võib vaja minna 4 kuud või rohkem raviks minoksiidiliga.

Ravi katkestamine võib põhjustada algse seisundi taastumist 3 - 4 kuu jooksul.



Hoida temperatuuril kuni 25°C, laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!